



Nickel Plus® 5-0-0

Instrucciones de Uso

Información General

Nickel Plus está recomendado para aplicación foliar únicamente. Se encuentra inmediatamente disponible y es absorbido rápidamente por el follaje.

Nickel Plus puede utilizarse en mezclas de tanque con otros productos fertilizantes y plaguicidas. No se recomienda utilizar Niquel Plus en aplicaciones al suelo.

Nickel Plus se dispersa en agua agitando ligeramente. Se pueden adicionar diferentes plaguicidas para su aplicación conjunta con Nickel Plus. Se recomienda seguir la siguiente secuencia de mezclado:

1. Agua
2. Nickel Plus
3. Plaguicida

Instrucciones de Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco. Apile un máximo de tres cubetas. Puede ser almacenado en una instalación que no cuente con calefacción. Nickel Plus es un producto de baja corrosividad. Los derrames de este producto se pueden absorber utilizando arcilla o algún otro material absorbente adecuado.

Garantía: NIPAN LLC garantiza que este producto se encuentra conforme a las especificaciones químicas de composición en la etiqueta y que es razonablemente adecuado para el propósito indicado en la etiqueta sólo cuando es utilizado de acuerdo con las instrucciones bajo condiciones de uso normales. Es imposible eliminar todos los riesgos inherentemente asociados al uso de este producto. Ni esta garantía, ni alguna otra garantía de comerciabilidad de idoneidad de un producto en particular expresa o implícita, se extiende para el uso de este producto contrario a las instrucciones de la etiqueta o bajo condiciones anormales que el vendedor no pueda predecir razonablemente, y el comprador asume el riesgo de tal uso.

Se puede obtener información acerca de los componentes de este producto escribiéndole al fabricante.

Análisis Garantizado

Nitrógeno Total (N).....	5.0%
Azufre (S).....	3.0%
Níquel (Ni).....	5.4%
Derivado de la urea y del lignosulfonato de Níquel	

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN:

Dañino si se ingiere. Evite el contacto con la piel, los ojos, y la ropa. Evite respirar las nebulizaciones de la aspersión. Puede ocasionar irritación en la nariz, la garganta, y/o la piel. Utilice gafas protectoras (goggles) y guantes durante la manipulación de este producto. En caso de que ocurra contacto, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua durante varios minutos.

Instrucciones de Uso – Pacana

Para la corrección y prevención de la **oreja de ratón** en pacana, y para reducir la pérdida de la nuez en junio y mejorar la resistencia a la **costra**. Se recomiendan dos aplicaciones por temporada. Realizar la primera aplicación para la corrección y la prevención de la **oreja de ratón** y para reducir la pérdida de nueces; la segunda aplicación mejora la resistencia contra la **costra**.

Primera aplicación: aplicar de 1 a 1.5 pintas por acre en el estado de “paracaídas”.

Segunda aplicación: mediados de julio, aplicar de 1.5 a 2 pintas por acre.

Para síntomas severos de **oreja de ratón**, y para tratar pacanas recién trasplantadas, aplicar 2 pintas por acre a principios de octubre antes de la caída de las hojas, y en la primavera durante el estado de “paracaídas”.

Fabricado en los EEUU por NIPAN LLC, P.O. Box 5611, 2867 Caroll Ulmer Rd. Valdosta, GA 31603-5611. Nickel Plus® es una Marca Registrada de NIPAN LLC Patente Pendiente

Otros cultivos:

Nickel Plus puede ser utilizado en un programa de fertilidad balanceada en el que la nutrición suplementaria de níquel puede mejorar el crecimiento, la calidad, la resistencia a enfermedades y el rendimiento de la cosecha. Se ha demostrado que la nutrición mejorada con níquel incrementa la resistencia a la roya.

Soya:

Para incrementar la masa radicular, la nodulación y la resistencia a la roya.

Dosis y programación: Aplicación terrestre: Aplicar de 12-16 onzas en 15-20 galones de agua por acre durante el estado R1 y repetir de 14 a 21 días después.

Soya para semilla:

El níquel es requerido para la germinación de la semilla. La nutrición mejorada con níquel en soya cultivada para semilla puede mejorar la germinación de la semilla seleccionada.

Dosis: Aplicar 8 onzas/acre, 30 a 60 días después de la siembra.

Se recomienda la adición de un surfactante no iónico a la dosis recomendada para mejorar la cobertura.

Algodón:

Dosis y programación: Aplicar 8 onzas/acre cuando los cuadros tengan el tamaño de la cabeza de un alfiler, o en combinación con la primera y segunda aplicación de un regulador de crecimiento que se utilice para controlar el crecimiento vegetativo excesivo.

Lirios de Día

La nutrición con níquel mejora la resistencia contra la roya. Aplicar 3 pintas en 100 galones de agua (1 cucharada/galón) a intervalos semanales por 3 semanas empezando al inicio de la primavera cuando las plantas inician el crecimiento activo. Después de las 3 aspersiones iniciales, aplicar cada 14-21 días hasta que las plantas empiecen a florecer. Volver a tratar en el otoño cuando las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la roya.

Pino – plántulas en vivero forestal

Las plántulas de pino destinadas a plantarse en suelos arenosos costeros pobres pueden beneficiarse de la nutrición suplementaria con níquel. Nickel Plus mejora la masa radicular y aumenta la resistencia contra la roya.

Dosis y programación: Aplicar 2 pintas/100 galones de agua cuando las plántulas midan 6-8 pulgadas de alto y repetir 3 semanas después.

Contenido Neto: 2.5 Galones / 9.46 Litros

Peso: 10.5 libras/galón (1.26 kg/L)